

ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ

Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ



Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Στρατιωτικός Ιατρός
Επιστημονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής ΑΠΘ
Αγγειοχειρουργός Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ στο γενικό πληθυσμό

Φλεβική Θρόμβωση 48 / 100 000

Πνευμονική Εμβολή 23 / 100 000

Φλεβική Θρόμβωση σε Νοσοκομειακούς ασθενείς

Γενική Χειρουργική 20 - 30 %

Ορθοπεδική 50 %

**ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ : 12 % των ασθενών
με φλεβική θρόμβωση**

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ

	%
Λοιμώξεις	5
Έμφραγμα Μυοκαρδίου	5 - 20
Ακτινοθεραπεία	40
Εγχειρτητικό Επείσώδιο	
παράλυτο σκέλος	60 - 70
φυσιολογικό σκέλος	10
Ασθενείς Παθολογίας	10 - 15

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ

Κάκωση Νωτιαίου Μυελού
Αρθροπλαστική Γόνατος
Ακρωτηριασμός
Αρθροπλαστική Ισχίου
Κάταγμα κάτω Άκρου
Προστατεκτομή
Λαπαροτομία - Γεν. Χειρουργική
Γυναικολογικές Επεμβάσεις
Μεταμόσχευση Νεφρού
Επεμβάσεις Θώρακα
Νευροχειρουργικές Επεμβάσεις

75 - 80 %



20- 25 %

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Επεμβάσεις κοιλίας ασθενείς
> 40 ετών + ιστορικό θρόμβωσης
Επεμβάσεις κοιλίας ή πυέλου
σε ασθενείς με κακοήθεια
Ορθοπεδικές επεμβάσεις ισχίου

ΜΕΤΡΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Επεμβάσεις γενικής χειρουργικής
> 30 min σε ασθενείς > 40 ετών

ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Επεμβάσεις χωρίς επιπλοκές
γενικής χειρουργικής < 30 min
σε ασθενείς < 40 ετών

ΦΛΕΒΙΚΗ
ΘΡΟΜΒΩΣΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ
ΕΜΒΟΛΗ

40 - 80 %

1 - 5 %

10 - 40 %

0,1 - 0,7 %

< 10 %

< 0.01 %

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ηλικία

Ιστορικό Θρόμβωσης

Παχυσαρκία

Επεμβάσεις στην Πύελο ή Ισχίο

Κακοήθεια

Κακώσεις Μαλακών Μορίων

Αντισυλληπτικά

Καρδιακή Ανεπάρκεια

Κιρσοί Κάτω Άκρων

Αυξημένη Γλοιότητα Αίματος

αφυδάτωση, πολυκυτταραιμία

•
•
•

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ :

- Βλάβη του ενδοθηλίου
- Στάση
- Αύξηση γλοιότητας του αίματος

(Τριάδα του Virchow)


• • • • • • • •

ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΘΡΟΜΒΩΝ

κάτω κοίλη
λαγόνιος
μηριαία
ιγνυακή
κνημιαίες





ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ



-
-
-







ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΗΛΙΚΙΑ

η συχνότητα φλεβικής θρόμβωσης αυξάνει με την ηλικία

> 40 έτη

↓ ελαστικότητα φλεβών κνήμης
↓ μάζα γαστροκνημίας (μυική αντλία)
συνύπαρξη προδιαθεσικών παραγόντων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

η συχνότητα φλεβικής θρόμβωσης και πνευμονικής εμβολής είναι διπλάσια σε παχύσαρκους

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

η παρατεταμένη κατάκλιση αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης φλεβικής θρόμβωσης
πχ παραπληγία, εγκεφ. επεισόδιο, Gullain Barre

ΦΥΛΟ οι γυναίκες προσβάλλονται συχνότερα

ΟΡΜΟΝΕΣ

η χορήγηση οιστρογόνων αυξάνει την
πιθανότητα φλεβικής θρόμβωσης x2 έως x10
υπάρχει συσχέτιση με τη δόση
(αντισυλληπτικά, οιστρογόνα σε Ca προστάτου)

ΚΥΗΣΗ - ΛΟΧΕΙΑ

η αύξηση εμφάνισης φλεβικής θρόμβωσης
αποδίδεται σε διαταραχές του πηκτικού μηχανισμού
υψηλά επίπεδα: ινωδογόνου, παραγόντων πήξης
ελάττωση: AT-III, πρωτεΐνης S

ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

**καρδιακά νοσήματα που ελαττώνουν την
καρδιακή παροχή και την φλεβική επιστροφή
αυξάνουν x3.5 τον κίνδυνο φλεβικής θρόμβωσης**

ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ

**“ οι ασθενείς με καρκίνο εμφανίζουν συχνά
φλεβική θρόμβωση ” *Trousseau (1861)***

κακοήθειες που συνοδεύονται από φλεβική θρόμβωση

καρκίνος παγκρέατος

αδενοκαρκινώματα

πολλαπλούν μυέλωμα

Ca μαστού, κόλπου, παχέος εντέρου

ΤΡΑΥΜΑ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

μεγάλα τραύματα ανεξάρτητα από την εντόπιση
προδιαθέτουν σε θρόμβωση και πνευμονική εμβολή

- ιστική καταστροφή ενεργοποιεί τον εξωγενή μηχανισμό πήξης
- φλεβικό τραύμα και στάση

κατάγματα

συνοδεύονται από
υψηλό ποσοστό
φλεβοθρόμβωσης και
πνευμονικής εμβολής

ΣΗΨΗ

οι μικροβιακές φλεγμονές διπλασιάζουν τον κίνδυνο φλεβικής θρόμβωσης μετεγχειρητικά

Gram - μικρόβια παράγουν Ενδοτοξίνη

- ενεργοποίηση μηχανισμού πήξης
- διάχυτη ενδαγγειακή πήξη

ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΦΛΕΒΟΘΡΟΜΒΩΣΗΣ – ΠΝ. ΕΜΒΟΛΗΣ

x 3 κίνδυνος φλεβικής θρόμβωσης μετεγχειρητικά

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

κίρσοι κάτω άκρων,
μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα,
μετάγγιση ασύμβατου αίματος

ΥΠΕΡΠΗΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ - ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ

Ανεπάρκεια Αντιθρομβίνης III

Ανεπάρκεια πρωτεΐνης C

Παράγοντας V Leiden

Ανεπάρκεια πρωτεΐνης S

Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα

ΥΠΕΡΠΗΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ - ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ

ανεπάρκεια Αντιθρομβίνης III

συγγενής (1: 2000) εκδηλώσεις μετά τη 2η δεκαετία
επίκτητη (DIC, ηπατική ανεπάρκεια, νεφρωσικό σ.)

κλινικά: επεισόδια φλεβικής Θρόμβωσης

θεραπεία: ηπαρίνη + FFP, 3-6 μήνες πο αντιπηκτικά

ανεπάρκεια πρωτεΐνης C

συγγενής (1:200 - 1:300) συχνή !

κλινικά: νέα άτομα, επιπολής θρομβοφλεβίτιδα

εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, πνευμονική εμβολή

θεραπεία: ηπαρίνη -- πο αντιπηκτικά

•
•
•

Κλινικές εκδηλώσεις της ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ

Κληρονομικότητα

Θρόμβωση σε νεαρή ηλικία

Υποτροπές

Θρόμβωση μετά από τοκετό, ταξίδια,
αντισυλληπτικά κλπ

Συνδυασμός φλεβικής και αρτηριακής
Θρόμβωσης

•
•
•

Κλινικές εκδηλώσεις της ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ

ασυνήθεις εντοπίσεις θρόμβωσης

Κάτω κοίλη φλέβα

Μεσεντέριος

Νεφρική

Ηπατικές φλέβες

Μασχαλιαία

-
-
-

αεροπορικά ταξίδια και φλεβοθρόμβωση



-
-
-

Economy class syndrome

Αιτιοπαθογένεια


1. Ξηρή Ατμόσφαιρα
2. Ακίνησία λόγω
περιορισμένου χώρου
3. Πίεση στην Ιγνυακή Χώρα
4. Υποξία & Χαμηλή
Ατμοσφ. Πίεση
5. Αλκοολούχα ποτά
6. Χαμηλή λήψη υγρών



Τρόποι Αντιμετώπισης :

1. Καλή Ενυδάτωση
2. ~~Αλκοολούχα και~~
~~Καφεϊνούχα~~
3. Άνετα Ρούχα
4. Αποφυγή
πολύωρου ύπνου
5. Ασκήσεις
6. Ασπιρίνη (πριν)
7. Όχι Κάπνισμα !
8. Ειδικές Κάλτσες
9. Αντιθρομβωτικά





ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ φλεβοθρόμβωσης

- χωρίς συμπτώματα
- αίσθημα βάρους στις κνήμες
- πόνος 50%
- οίδημα
- διάταση επιπολής φλεβών
- ερύθημα
- σημείο Homans (μη ειδικό)

ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ

**μονόπλευρο οίδημα το πιο ειδικό σημείο
πόνος (50%)**

ευαισθησία

πυρετός (χαμηλός)

σημεία Πνευμονικής Εμβολής

(10% ασθενών ως πρώτη εκδήλωση)



ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ

σημείο Homans
μη ειδικό



1/ 3 ασθενών θρόμβωση

1/ 2 ασθενών χωρίς θρόμβωση


ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ

η κλινική εξέταση

θέτει την **υποψία** της διάγνωσης
είναι ακριβής μόνο σε 50 % των περιπτώσεων

συνεκτίμηση επιβαρυντικών παραγόντων
επιβεβαίωση με παρακλινικές εξετάσεις


ΑΘΑΕΩΑΟÇ ÔÇÓ ÈÑÏÀÙÓÇÓ ÓÀ ÏËÏ ÔÏ ΑÍ ÔÙ ΑΑÈΑÉ ÖËΑΑÉÊÏ ÓÕÓÔÇÌÁ



phegmasia alba dolens

ËÄÕÊÇ ΑΘÙÄÕÍÇ ÖËÄÃÏÏÇ

ù÷ñü Üêñï, ïßäçìá,
áðüöñáîç ëàìöáããåßùí



phegmasia caerulea dolens

ÊÕÁÍÇ ΑΘÙÄÕÍÇ ÖËÄÃÏÏÇ

êõÜíùόç, ïßäçìá, ðåôÝ÷åéåò
åê÷õìπόάέò, öõóóáëßääò
+ áðüöñáîç áñôçñépí
öëååéêþ ãÜããñáéíá
õðïïãêéáéìßá, shock

ΚΥΑΝΗ ΕΠΩΔΥΝΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ



**λαγονομηριαία φλεβοθρόμβωση
επέκταση σε όλες τις φλέβες του σκέλους**

ΚΥΑΝΗ ΕΠΩΔΥΝΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ

παθοφυσιολογία

αύξηση της φλεβικής πίεσης

διαπίδυση υγρών στον τρίτο χώρο

οίδημα

πίεση διάμεσο χώρο $>$ υδροστατική αρτηριολίων

υποογκαιμία
υπόταση
ταχυκαρδία
ολιγουρία

ισχαιμία σκέλους

απουσία περιφερικών σφύξεων
ψυχρό σκέλος

ΚΥΑΝΗ ΕΠΩΔΥΝΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ



**μεγάλο οίδημα
κυανωτικό ψυχρό άκρο
συνεχής πόνος
απώλεια αισθητικότητας - κινητικότητας
υποογκαιμία**

ΚΥΑΝΗ ΕΠΩΔΥΝΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ

ιστορικό

κακοήθεια (30%)
χειρουργική επέμβαση
κύηση
υπερπηκτικές καταστάσεις



πρόγνωση

φλεβική γάγγραινα
ακρωτηριασμός 20-50%
θνητότητα 1/3

φλεβική γάγγραινα



σύνδρομο May-Thurner



ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Μυϊκή Θλάση

Ρήξη Μυός + Αιμάτωμα

Ρήξη κύστης Baker

Λεμφαγγειίτιδα

Αρθρίτιδα, Μυοσίτιδα

Επιπολής Θρομβοφλεβίτιδα

ΠΟΝΟΣ

Λεμφοίδημα

Νεφρωσικό σύνδρομο

Καρδιακή ανεπάρκεια

Εξωτ. πίεση: Λεμφαδένες, Νεοπλασίες

Αρτηριοφλεβική Επικοινωνία

ΟΙΔΗΜΑ

ΕΚΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ

- Πνευμονική Εμβολή
- Φλεβική Γάγγραινα
- Πλήρης Ανάνηψη
- Επαναστραγγοποίηση
- Μόνιμη απόφραξη του αυλού
- Ανεπάρκεια των βαλβίδων
- Ανεπάρκεια των διατιτραινουσών

•
•
•

ΜΕΤΑΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

- Οίδημα
- Διάταση Επιπολής Φλεβών
- Πόνος κατά τη βάρδιση (φλεβικής αιτίας)
- Δερματικές αλλοιώσεις
 - πάχυνση - σκλήρυνση
 - εναπόθεση αιμοσιδηρίνης
 - εκζεματοειδείς βλάβες
 - άτονα έλκη

• • • • • • • • •




(c) University Erlangen,
Department of Dermatology
Phone: (+49) 9131-85-2727





ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΙΔΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ

ΛΕΜΦΙΚΟ

ΛΙΠΟΙΔΗΜΑ

ΦΛΕΒΙΚΟ

ΒΛΑΒΗ	ΟΙΔΗΜΑ ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ	ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΩΝ	ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΛΙΠΟΥΣ	ΦΛΕΒΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΦΥΣΗ ΟΙΔΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΩΜΑ	ΜΑΛΑΚΟ +++	ΣΚΛΗΡΟ ΟΧΙ	ΟΧΙ	± ΜΑΛΑΚΟ ΑΡΧΙΚΑ
ΠΑΧΥΝΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	ΟΧΙ	ΥΠΑΡΧΕΙ	ΟΧΙ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΕΛΚΗ	ΟΧΙ	ΣΠΑΝΙΑ	ΟΧΙ	ΣΥΧΝΑ
ΥΠΕΡΧΡΩΣΗ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ ΔΑΚΤΥΛΑ ΠΑΧΙΑ	ΟΧΙ	ΝΑΙ
ΑΜΦΩ ΕΝΤΟΠΙΣΗ	ΠΑΝΤΑ	ΣΥΧΝΑ	ΠΑΝΤΑ	ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ

ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ



Erlangen,
Department of Dermatology
Phone: (+49) 9131-85-2727

ΕΛΚΟΣ



ΦΛΕΒΙΚΟ



ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ



ΤΡΟΦΙΚΟ

ΕΝΤΟΠΙΣΗ	ΕΣΩ ΣΦΥΡΟ	ΔΑΚΤΥΛΑ Σημεία ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ	Σημεία ΠΙΕΣΗΣ
ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΔΕΡΜΑ	ΔΥΣΧΡΩΜΙΑ ΚΑΦΕΟΕΙΔΕΣ	ΑΤΡΟΦΙΑ	ΤΥΛΩΔΕΣ
ΠΟΝΟΣ	ΟΧΙ ΕΝΤΟΝΟΣ	ΠΟΛΥ ΕΝΤΟΝΟΣ	ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ
ΣΥΝΟΔΗ ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ	ΟΧΙ	ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ	ΟΧΙ
ΣΥΝΟΔΑ ΣΗΜΕΙΑ	ΕΚΖΕΜΑ ΟΙΔΗΜΑ ΚΥΑΝΩΣΗ ΚΙΡΣΟΙ	ΛΕΠΤΟ ΔΕΡΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΧΕΣ ΔΥΣΤΡΟΦΙΚΑ ΝΥΧΙΑ	ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ


- ανιούσα Φλεβογραφία
- Πληθυσμογραφία → υδραργυρική
αεριο-
φωτο-
- απλό αιμοταχύμετρο (Doppler)
- Υπερηχογράφημα Duplex \ Triplex

-
-
-

Πληθυσμογραφία


μέτρηση μεταβολών όγκου στο άκρο
που οφείλονται σε μεταβολές πλήρωσης των φλεβών

υδραργυρικός πληθυσμογράφος
ελέγχει την φλεβική απορροή του σκέλους
> 45ml/min



•
•

Αεροπληθυσμογραφία :
εκτίμηση φλεβικής απόφραξης,παλινδρόμησης,
λειτουργία αντλίας γαστροκνημίας




-
-
-

Απλό Αιμοταχύμετρο (Doppler)

έλεγχος ροής σε
μηριαία, ιγνυακή, κνημιαίες φλέβες

- Υπερηχογράφημα Duplex \ Triplex






-
-
-

Aíéiýóá Öëåâĩãñáößá

åõáßóèçôç ìÝèĩäïò
äéáãíùóôéêß áêñßâåéá

Ýã÷õóç óêéáóôéêÿ
áðåéêüíéóç åðéðïëßò
êáé áí ôù âÛèåé öëåâí







θρόμβωση μηριαίας φλέβας



•
•
•



•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gadolinium

MRI

**ΘΡΟΜΒΩΣΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ
ΦΛΕΒΑΣ**



MRI



**ΘΡΟΜΒΩΣΗ
ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΗΣ
ΦΛΕΒΑΣ**

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ: Πρόληψη των επιπλοκών

- Αποφυγή επέκτασης θρόμβου
- Διατήρηση παράπλευρης κυκλοφορίας
- Αποφυγή Πνευμονικής Εμβολής
- Διαφύλαξη Βαλβίδων
- Αποφυγή Μεταθρομβωτικού συνδρόμου

ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1. ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
2. ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ
3. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΡΟΜΒΕΚΤΟΜΗ

-
- **1. ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ**

- **α. ΗΠΑΡΙΝΗ**

Ενδοφλέβια Χορήγηση

Δράση: αναστέλλει το σχηματισμό ινώδους
μέσω αντιθρομβίνης III

Δόση: 100-200U\Kgr\h bolus

1000-1500U\h στάγδην έγχυση

Διάρκεια Θεραπείας: 5-7 ημέρες

Έλεγχος: μέτρηση PTT x1,5-x2,5

Αντίδοτο: Θειϊκή Πρωταμίνη

100 U heparin = 1 mg πρωταμίνη

α. ΗΠΑΡΙΝΗ

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Αιμορραγία (10%)

PTT > x3, ουραιμία, υπερήλικες

Θρομβοπενία

μέσω IgG - IC

σοβαρή επιπλοκή (αιμορραγίες+θρομβώσεις)

Συχνότητα: 4 - 5 % των ασθενών

Εμφάνιση: σε 2 έως 15 ημέρες

αιμοπετάλια < 100 000

•
•
•

α. ΗΠΑΡΙΝΗ

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ενεργός αιμορραγία (πχ έλκος)

κακοήθης υπέρταση

πρόσφατη Ν/Χειρουργική επέμβαση

υπαραχνοειδής ή εγκεφαλική αιμορραγία

αιμορραγική διάθεση (πχ θρομβοπενία)

•
•
•

ΗΠΑΡΙΝΗ (LMWH)

μικρού μοριακού βάρους

- Υποδόρια χορήγηση κάθε 12 ή 24 h
- Δεν επηρεάζεται ο χρόνος PPT
- Δεν απαιτείται έλεγχος δραστηριότητας
- Λιγότερες αιμορραγικές επιπλοκές
- Μικρότερο ποσοστό εμφάνισης Θρομβοπενίας
- Μικρότερος κίνδυνος Οστεοπώρωσης
- Ασφαλής χορήγηση στο σπίτι

·
· **1. ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ**

β. ΚΟΥΜΑΡΙΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

Χορήγηση από το στόμα

Δράση: αναστέλλουν τη σύνθεση των
παραγόντων II, VII, XI, X στο ήπαρ

Δόση: εξατομικεύεται

2- 15 mg (Sintrom)

έναρξη 48 h πριν διακοπεί η ηπαρίνη

Διάρκεια Θεραπείας: 3 - 6 μήνες

Έλεγχος: μέτρηση PT x2 x2,5, INR x2,5

Αντίδοτο: βιταμίνη K, FFP

-
- 1. ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

β. ΚΟΥΜΑΡΙΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Αιμορραγία

πτετέχειες, εκχυμώσεις, αιματοουρία
ρινορραγία, αιμορραγία γαστρεντερικού

Νεκρώσεις Δέρματος

↓ πρωτεΐνη C → θρομβώσεις δερμ. αγγείων

-
- **1. ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ**

β. ΚΟΥΜΑΡΙΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

κακοήθης υπέρταση

ενεργός αιμορραγία πεπτικό έλκος

ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια

κύηση ή γάλακτος / θηλασμός

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ: NSAID, ασπιρίνη, Zyloric

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: βαρβιτουρικά,

αντιεπιληπτικά,

χημειοθεραπευτικά

-
-
-
-
-
-
-
-

•
•
•

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

1. Ελάττωση Φλεβικής Στάσης

πρώιμη κινητοποίηση

ελαστική συμπίεση

ελαστικές κάλτσες

αεροθάλαμοι

2. Αντιπηκτικά Φάρμακα

ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους

υποδόρια χορήγηση

**αποτελεσματικότητα της πρόληψης σε επεμβάσεις
του ισχίου
(Salzman and Hirsh, 1987)**

Agent	patients	Thrombosis(%)	% reduction
Aspirin	309	40	13
Dextran	123	17	57
Warfarin	208	25	48
Low-dose heparin	301	22	57
		(pooled	
Control	979	47	-
LMWH	50	12	72
(enoxaparin)		(single studies)	



**ΣΕ ΠΟΙΕΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΕΙΝΑΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
Η ΠΡΟΛΗΨΗ
ΤΗΣ
ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ
?**

heparin



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Επεμβάσεις κοιλίας ασθενείς
> 40 ετών + ιστορικό θρόμβωσης
Επεμβάσεις κοιλίας ή πυέλου
σε ασθενείς με κακοήθεια
Ορθοπεδικές επεμβάσεις ισχίου

ΜΕΤΡΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Επεμβάσεις γενικής χειρουργικής
> 30 min σε ασθενείς > 40 ετών


ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1. προλαμβάνει τον σχηματισμό επιθρόμβου χωρίς να επιδρά στον ήδη σχηματισμένο θρόμβο
2. σε 40 % των ασθενών αν και βρίσκονται σε αγωγή με ηπαρίνη διαπιστώνεται με υπερήχους επέκταση του θρόμβου
3. σε λαγονομηριαία θρόμβωση (θρόμβος > 7 cm) σχεδόν ποτέ δεν γίνεται επανασηραγγοποίηση
4. 95 % των ασθενών μετά από 5 χρόνια εμφανίζει ανεπάρκεια των βαλβίδων

•
•
•

2. ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ

ΠΗΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ



ΙΝΩΔΟΛΥΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

• • • • •

ΕñïâïëõôéeÛ

στρεπτοκινάση Streptase

ουροκινάση Ukidan

**ιστικός ενεργοποιητής πλασμινογόνου
(r-TPA) Actilyse**

·
·
·
ÈÑÌÌÂÏËÕÓÇ

ÔïðéêÞ ÄéáêáèâôÞñéá Èñììâüëõóç

ôïðéêÞ óõía÷Þ Ýã÷õóç

èñììâïëõôéêÞ í ðáñáãüíôùí ãéá 24 Ýùò 48 h

óôü÷ié

ðñþéìç ëýóç ôïõ èñüìâïõ

ãéáöýéáìç ôùí âáéâßäùí

αðïõõãÞ ìâôáèñììâùòééìý óõíáñüìõ

áíãáßîáéò

ãðééããìÝíá ðãñéóôáôééÛ

èñüìâùóç < 7 ìÝñãò

•
ÔÅ×ÍÊÊÇ


ÔÏÐÉÊÇ ÄÉÁÊÁÈÀÔÇÑÉÁ ÈÑÏÀÏËÕÓÇ

á. ðñïóðÝëáóç
êáèååôçñéáóíüò



- i. ÄåîéÛ Ýóù Óöáãßôéää
- ii. Ìçñéáßá ÕëÝâá
- iii. Éãíõáêþ ÕëÝâá
- iv. Âñá÷éüíéìò ÕëÝâá



â. áéóáãùãþ óõñìÛôéíì õäçãíý êáé êáèååôþñá
áíôüò ôíõ èñüìâíõ




-
-
-

êáèåôPñáo
èñîâüëóóçò

èñüîâiò





·
· ÔÅ×ÍÊÊÇ

ÔÏΘÊÊÇ ÄÉÁÊÁÈÅÔÇÑÉÁ ÈÑÏÄÏËÕÓÇ

έγχυση rTPA

όοόôçìáôéêÞ ÷'ĩÞãçóç ÇΘÁÑÉÍÇÓ

PTT: 50 - 90 sec

åðáíÛëçøç Õëåâïãñåöβáò óå 24 h

παρακολούθηση ινωδογόνου > 100mg/dl

äéüñèùóç ðéèáíþí óôåíþóåùí

ìå åããåéïðëåóóêéêÞ / stent



55 ΕΤΩΝ

οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση

οίδημα κάτω άκρων

ΑΠΟΦΡΑΞΗ

ΛΑΓΟΝΙΩΝ ΦΛΕΒΩΝ

ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ

**διακαθετήρια έγχυση
ουροκινάσης x 28 h**

**λύση του θρόμβου
υπολειμματική στένωση**



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ STENT

**Gianturco-Rösch Z-stents.
12.5 x 2 cm**



**καλή βατότητα
5 μήνες μετά**

Èñïîâóëõøη

ǎđéđëïêÝò

áéìññáãßǎò, x 2 - 5
áéíáôþíáôá (ÊÍÓ, ÑÑÓ, ïöéóèïðǎñéôïíáúêÛ)
áëëǎñǎééÝò áíôéǎñÛóǎéò

áíôǎíǎǎßîǎéò

ǎíǎñǎüò áéìññáãßá, êýçóç
ðñüóöáôǎò ǎđǎíâÛóǎéò ïöèáéïíý þ ÊÍÓ
ðñüóöáôç ïǎǎÛëç ÷ǎéñïññǎéêþ ǎđÝíǎáóç
(< 10 ïÝñǎò)

...

ΟΙΘΕΕΣ ÄÉÁÊÁÈÁÔÇÑÉÁ ÈÑÏÂÏËÕÓÇ

ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

**~ 70% πλήρης λύση
~ 15 % μερική λύση**

του θρόμβου

**85%
κλινική
βελτίωση**

•
•
•

ΟΙΘΕΕÇ ÄÉÁÊÁÈÀÔÇÑÉÁ ÈÑÏÀÎÏËÕÓÇ

21 άόέάíáßò (10 Á 11 Ã) **27** óêÝëç
24 - 74 Ýôç Ì.Ç. 54,8

ðëÞñçò ëýóç ôïò èñüìâïò 72%

ìáñéêÞ ëýóç ôïò èñüìâïò 20%

êáììßá áðßäñáóç 8%

êëéíéêÞ âäëôßùóç - òðï÷þñçóç ïéäÞíáôïò 85%

ÊáëÛ áðïôáëÝóíáôá óá άόέάíáßò ìá

óõìðôùíáôéêÞ ëáãíïïçñéáßá èñüìâùóç

ðñüóöáôçò äãêáôÛóôáóçò < 7 çìÝñâò

Semba P, Dake M. Radiology 1994

• • • • • • • • •

3. ×ÅÉÑĬÕÑÃÉÊÇ ÈÃÑÁÐÁÉÁ



ǎíôüò 3 çìǎñþí áðü ôçí
ǎãêáôÛóôáóç ôçò èñüìâùóçò

ÐǎñéĩñéóíÝíǎò **Áíǎǎβîǎéò**


- ëáãĩĩĩçñéáβǎ èñüìâùóç ìǎ âáñǎéÛ êëéíéêþ áéêüíǎ
- ǎðǎðǎéëĩýíǎíç öëǎâéêþ ǎÛǎñǎéíǎ


Ôǎ÷íéêþ

**Èñüìâǎêôĩþ ìǎ Fogarty
+ òñĩóùñéíþ Á-Ö ǎðéêëéíüíβǎ**



×ΑΕΝΙΟΝΑΕΕÇ ÈÑÌÄÄÊÔÌÇ

- Ðáñáóêãõß Ìçñéáßáò ÖëÝâáò
- Áöáßñáóc ôïõ êáíôñéêÿ èñüìâïõ
Fogarty 8-10 F
- PEEP > 10cm H₂O






ÈÑÌÀÄÊÔÌÇ




×ΑΕΝΙΩΝΑΕΕÇ ÈÑÌÄÄÊÔÌÇ



Áöáßñáoç èñüìâuí áðu ðañéöÝñáέα
ìà äëáoôéeê ðañßäáoç



ãðßäáoìò Esmarch



×ΑΈÑĬŌÑÃÉEÊÇ ÈÑĬĬÂAÊÔĬÇ

Äçìéíõñãßá õñíóùñéíÞò
áñôçñéíïëäâéêÞò äðééíéíùíßáò

Óýãêëäéóç óå 1 - 3 ìÞíåò

ÁíôéðçêôéêÞ áãùãÞ x 3 - 6 ìÞíåò
(äééíõíáñüëç)

⋮

ÄÉÄÃÑÌÉÊÇ ÔÏÐÏÈÀÔÇÓÇ ÖÉEÔÑÛÌ
ÓÔÇÌ ÊÁÔÙ ÈÌÉÊÇ ÆÄÄÄ

óôü÷ìò: òñüëçøç ôçò Ðíãõïïíéêþò Àìâìëþò

ǎíäǎßîǎéò:

óǎ áóèǎíǎßò òïõ Ý÷ïïí ǎðǎéóüäéá òíǎõïïíéêþò
ǎìâìëþò ǎíp ǎñßóêïííáé õðü áíôéðçêôéêþ ǎǎùǎþ

óǎ áíôǎíäǎßîǎéò ÷ïñþǎçóçò
áíôéðçêôéêþí öǎñìÛêùí

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΗ ΦΛΕΒΑ



αντενδείξεις αντιπηκτικών σε ΠΕ ή ΕΦΘ **αιμορραγία**

αποτυχία αντιπηκτικής αγωγής **υποτροπή πνευμονικής
εμβολής**


επιπλοκές αντιπηκτικών **θρομβοπενία,
αιμορραγία ΚΝΣ, ΓΕΣ**


θρόμβος που επιπλέει στην κάτω κοίλη

-
-
-



-
-
-





ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

πνευμονική καρδιά + φλεβοθρόμβωση / πνευμ. εμβολή
μεγάλος κίνδυνος επιπλοκών από αντιπηκτικά
μεταστάσεις


προληπτική τοποθέτηση σε βαριές κακώσεις

- κάκωση σπονδυλικής στήλης-νωτιαίου μυελού
- κρανιοεγκεφαλική κάκωση
- κατάγματα πυέλου
- πολλαπλά κατάγματα μακρών οστών
- ιστορικό φλεβοθρόμβωσης









προφυλακτικά σε αντικατάσταση ισχίου


⋮
ÔÅ×ÍÉÊÇ
ÔÏΘÏÈΑÔÇÓÇÓ
ÖÉEÔÑÏÕ ÓÔÇÍ ê. ÊÏÉËÇ ÖËÅÂÁ



-
-
-







ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

επιπλοκές από την παρακέντηση

αιματώματα
τοπική θρόμβωση
(μηριαία φλέβα)

μετατόπιση του φίλτρου

τύπος φίλτρου
διάμετρος κοίλης

>28mm

διάτρηση κάτω κοίλης

απόφραξη κάτω κοίλης

bird's nest
filter

ROPPINS HOSPITAL
10-19

07-F
14:
W-L
W-L

R




ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΦΙΛΤΡΑ

- διαδερμική τοποθέτηση

δ. έσω σφαγίτιδα
βραχιόνιος φλέβα

- βραχύχρονη παραμονή 3 - 14 μέρες
όσο διαρκεί η θρομβόλυση
άμεση μετεγχειρητική περίοδο
ακινητοποίηση σε πολυτραυματίες

μεγαλύτερη ελευθερία στη χρήση
και διεύρυνση των ενδείξεων



**τοποθέτηση προσωρινού φίλτρου
στην κάτω κοίλη**





63 ετών

**ολική αρthroπλαστική ισχίου
εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση
πνευμονική εμβολή
θρόμβος στην αρ. λαγόνιο
και στην κάτω κοίλη**


ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ


- τοπική διακαθετήρια θρομβόλυση
- τοποθέτηση προσωρινού φίλτρου στην κάτω κοίλη












παρακέντηση βραχιονίου φλέβας








-
-
-





-
-
-
-
-
-
-
-
-



-
-
-








-
-
-

ειδικοί τύποι φίλτρων

EASY to retrieve






OPTEASE™

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Πνευμονική Εμβολή








cm 1 2 3 4 5
JHU- Anatomic Path











**μικροσκοπική εικόνα θρόμβου σε πνευμονική αρτηρία.
"lines of Zahn"
στοιβάδες ερυθρών αιμοσφαιρίων αιμοπεταλίων και ινικής**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ

ΟΞΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ



ΥΠΟΤΑΣΗ



ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ



ΘΑΝΑΤΟΣ 85%

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ Π.Ε.

ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ

ή

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ

ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ+ΤΑΧΥΠΝΟΙΑ+ΥΠΟΤΑΣΗ+ΠΥΡΕΤΟΣ

ή

ΔΙΕΓΕΡΣΗ + ΚΑΚΟΥΧΙΑ + ΝΑΥΤΙΑ + ΕΜΕΤΟΙ

ή

ΑΤΥΠΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΑΔΕΣ

- ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ + ΤΑΧΥΠΝΟΙΑ + ΠΥΡΕΤΟΣ (Allen)
- ΑΙΜΟΠΤΥΣΗ + ΠΛΕΥΡ.ΠΟΝΟΣ+ ΘΡΟΜΒΟΦΛΕΒΙΤΙΔΑ (10%)
- ΑΙΜΟΠΤΥΣΗ + ΒΗΧΑΣ + ΕΦΙΔΡΩΣΗ
- ΑΙΜΟΠΤΥΣΗ + ΒΗΧΑΣ + ΔΥΣΠΝΟΙΑ
- ΑΙΜΟΠΤΥΣΗ + ΠΛΕΥΡ.ΠΟΝΟΣ + ΔΥΣΠΝΟΙΑ

Συμπτώματα

κλασική τριάδα

Θωρακικός Πόνος (80-90%)

πλευριτικός (74%)

μη πλευριτικός (14%)

Βήχας (40-53%)

Αιμόπτυση (13-20%)

ΔΥΣΠΝΟΙΑ (75-85%)

ΤΑΧΥΠΝΟΙΑ (80-90%)

ΤΡΙΖΟΝΤΕΣ - ΡΟΓΧΟΙ (50-58%)

ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ (40-50%)

ΠΥΡΕΤΟΣ (40%)

37.8 - 38.5 C

ΥΠΟΤΑΣΗ - SHOCK (8%)

ΤΙΜΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

- $\text{PaO}_2 < 80 \text{ mmHg}$
- $\text{PaCO}_2 < 35 \text{ mmHg}$
- $\text{pH} > 7.43$


ΥΠΟΞΥΓΟΝΑΙΜΙΑ

- ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΔΙΗΘΗΣΗ O_2
- ΑΥΞΗΣΗ ΔΕΞΙΟΥ / ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ SHUNT
(λόγω ανομοιογενούς καταμερισμού
αιματικής ροής και κυψελιδικού αερισμού)


ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Λευκά – τύπος >
- ΤΚΕ >
- Χολερυθρίνη >
- LDH >
- SGOT -
- έλεγχος
πηκτικότητας
- Αέρια αίματος
- ΗΚΓ
- Υπέρηχοι Καρδιάς
- Α/α Θώρακος
- Σπινθηρογράφημα
αιμάτωσης– αερισμού
- Αρτηριογραφία

ΕΜΜΕΣΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Π.Ε.



- Πλευριτικό υγρό
- Ανύψωση του διαφράγματος
- Αύξηση καρδιακής σκιάς
- Αύξηση μεσοπλευρίων διαστημάτων



Φλεβοκομβική Ταχυκαρδία

S I

Q III, αναστροφή T

αναστροφή T V₁ - V₃

S1Q3T3

•
•
•

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Κλινική εικόνα

Υψηλός δείκτης κλινικής υποψίας
Εκτίμηση κλινικών σημείων
Παραμέτρων σε ασθενείς στη ΜΕΘ


Παρακλινικές εξετάσεις

σπινθηρογράφημα αερισμού/αιμάτωσης
αγγειογραφία


ΔΙΑΓΝΩΣΗ

στηνθηρογράφημα αερισμού/αιμάτωσης

VENTILATION SCAN




PERFUSION SCAN




Lung Perfusion




Rt Lat




Anterior



Lt Lat



LPO





Posterior



RPO

Lung Perfusion





-
-
-





ΘΕΡΑΠΕΙΑ

- ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗ
- ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ
- ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ

χωρίς διάγνωση θνητότητα 30%

πρώιμη διάγνωση θνητότητα 3%